FACOLTÀ DI
MEDICINA E CHIRURGIA
Università degli Studi di Verona

Apparato muscolare

TESSUTO MUSCOLARE

- MUSCOLO SCHELETRICO
- MUSCOLO CARDIACO
- MUSCOLO LISCIO

- Eccitabilità → capacità di rispondere a stimoli nervosi o ormonali
- Contrattilità → capacità di contrazione attiva
- Estensibilità → capacità di contrazione ripetuta
- Elasticità → capacità di ritornare alla lunghezza di riposo dopo ogni contrazione

Funzioni muscolo scheletrico

Dinamica, permette il movimento dello scheletro

Posturale

Supporto per i tessuti molli,
parete addominale-pavimento pelvico

Regolazione dell'entrata ed uscita di sostanze

Termoregolazione

Componente fondamentale connettivale:

- Epimisio
- Perimisio
- Endomisio

Queste tre componenti alle estremità del fascio muscolare convergono e si fondono a formare il tendine

(a) MUSCOLO SCHELETRICO

Circondato da:
Epimisio

Contiene:
Fascicoli muscolari

(b) FASCICOLO MUSCOLARE

Circondato da:
Perimisio

Contiene:
Fibre muscolari

(c) FIBRA MUSCOLARE

Circondata da:
Endomisio

Contiene:
Miofibrille

(d) MIOFIBRILLA

Circondata da:
Reticolo sarcoplasmatico

Consiste di:
Sarcomeri
(da linea Z a linea Z)

(e) SARCOMERO

Contiene:
Filamenti spessi
Filamenti sottili

FIGURA 9-10

Orientamento del reticolo sarcoplasmatico, dei tubuli T e del sarcomero. Si forma una triade quando un tubulo T circonda il sarcomero tra 2 cisterne terminali. Raffronta con la *Fig. 9-4c p. 245*; si noti che le triadi si formano sulle zone di sovrapposizione.

FIGURA 9-6

Filamenti spessi e sottili. I miofilamenti sono fasci di proteine filamentose spessi e sottili. **(a)** Attacco dei filamenti sottili alla linea Z. **(b)** Struttura di un filamento sottile: organizzazione della G-actina, della troponina e della tropomiosina. **(c)** Struttura di un filamento spesso. **(d)** Molecola di miosina: osservare il movimento della testa in seguito alla creazione di legami crociati.

Giunzione neuro-muscolare

FIGURA 9-11

Giunzione neuromuscolare. Relazioni anatomiche tra un bottone sinaptico e la membrana della fibra muscolare scheletrica. Vedi anche Fig. 9-2.

FIGURA 9-2

Innervazione della muscolatura scheletrica. Le fibre muscolari scheletriche sono stimulate da fibre nervose a livello della giunzione neuromuscolare. (a) Diverse giunzioni neuromuscolari (MO $\times$ 230); (b) immagine di giunzioni neuromuscolari osservata a colori al MES.

Sensibilità dal muscolo = sensibilità propriocettiva.

Fibre dolorifiche sono fibre libere, corpuscoli del Pacini (pressione), organi tendinei del Golgi (grado di tensione nei tendini)

Innervazione = motoneuroni alfa (fibre extra fusali), motoneuroni gamma (Fusi neuromuscolari), motoneuroni beta (fibre fusali ed extrafusali).

FIGURA 9-12
Sequenza di eventi della contrazione muscolare.

FIGURA 9-13

Organizzazione delle unità motorie all'interno della muscolatura scheletrica. Le fibre muscolari di unità motorie differenti sono intercalate, così la distribuzione della forza applicata al tendine rimane costante anche quando gruppi di muscoli alternano contrazione a rilassamento. Il numero delle fibre di un'unità motoria può variare da 2-3 a più di 2000.

Fibrocellule muscolari lisce

(colorazione ematossilina-eosina) si osservano *aggregati di cellule muscolari lisce sezionate longitudinalmente.*

Trattasi di elementi fusiformi con citoplasma eosinofilo (acidofilo); il nucleo, fusiforme, colorato dall'ematossilina occupa la parte più allargata della cellula.

(a) Muscolo parallelo

(b) Muscolo convergente

(c) Muscolo unipennato

(d) Muscolo bipennato

(e) Muscolo multipennato

Rilassato

Contratto

(f) Muscolo circolare

FIGURA 9-15

Orientamento delle fibre all'interno di un muscolo. Sono visibili quattro differenti disposizioni di modelli di fibre muscolari: (a) muscolo parallelo; (b) muscolo convergente; (c,d,e) muscolo pennato; (f) muscolo circolare.

(a) Leva di prima classe

(b) Leva di seconda classe

(c) Leva di terza classe

FIGURA 9-16

Le 3 classi di leve. Le leve sono strutture rigide che si muovono intorno a un punto fisso detto fulcro. **(a) Leva di I ordine:** il fulcro si trova tra la resistenza e la forza applicata; questo tipo di leva può far variare la quantità di forza trasmessa alla resistenza, e alterare direzione e velocità del movimento. **(b) Leva di II tipo:** la resistenza si trova tra la forza applicata e il fulcro; questa disposizione amplifica la forza a spese della distanza e della velocità, mentre la direzione del movimento resta invariata. **(c) Leva di III tipo:** la forza applicata si trova tra la resistenza e il fulcro; ciò incrementa la velocità e la distanza di movimento, ma richiede una forza di applicazione maggiore.

FIGURA 10-1
 Veduta anteriore del piano superficiale della muscolatura scheletrica. Una visione schematica della muscolatura assile ed appendicolare.

FIGURA 10-2
 Veduta posteriore del piano superficiale della muscolatura scheletrica.

MUSCOLI DELLA TESTA

Muscoli Pellicciai o Mimici ---→ tutti innervati dal n. facciale
Inserzione con un'estremità su una superficie scheletrica e con l'altra estremità sulla faccia profonda della cute

mm. della volta cranica
mm. delle palpebre
mm. del naso
mm. della bocca

Muscoli Masticatori

m. Massetere
m. temporale
m. Pterigoideo interno
m. Pterigoideo esterno

(a) Veduta laterale

Cranio

Mandibola

(c) Origini e inserzioni

(a) Veduta anteriore

(b) Origini e inserzioni

mm testa e collo

(a) Veduta laterale

(b) Veduta laterale che mostra i muscoli pterigoidei

(c) Inserzioni dei muscoli sul ramo sinistro interno della mandibola

Cranio

Mandibola
(c) Origini e inserzioni

Muscoli masticatori

Muscoli estrinseci della lingua

Genio-
lo-
Palato-
Stilo-

-glosso
dal greco *glossa* = lingua

Innervazione = n. ipoglosso (XII paio)

Muscoli intrinseci della lingua

Inseriscono nella faccia int. della mucosa della lingua

MM longitudinali sup ed inf
M trasverso della lingua
M verticale della lingua

Muscoli della faringe

FIGURA 10-9
Muscoli della faringe. I muscoli della faringe danno inizio alla deglutizione.
 (a) Veduta laterale. (b) Sezione sagittale mediana.

MUSCOLI DEL COLLO

MM anteriori del collo:

•mm. Pellicciai

Platisma

•mm. Scheletrici sopra-ioidei

Digastrico, stilo-ioideo,
milo-ioideo, genio-ioideo

sotto-ioidei

Omo-ioideo, sterno-ioideo,
crico-tiroioideo,
sterno-tiro-ioideo, tiro-ioideo

MM laterali del collo:

•mm. Profondi

mm. Scaleni: anteriore, posteriore e medio

•mm. superficiale

m. sterno-cleido-mastoideo

MM pre-vertebrali e posteriori:

m. Lungo del collo
m. Lungo della testa
m. Retto ant. della testa

Platisma

Origine:

clavicola (porzione inferiore)
e fascia del torace

Inserzione:

mandibola

innervazione:

ramo cervicale

azione: disegna gli angoli della bocca tendendoli verso il basso. Inoltre tende la pelle del collo quando i denti sono serrati.

MM antagonisti:

M. massetere, M. Temporale

MM. Anteriori del collo

mm che stabilizzano la posizione della laringe, della mandibola, del pavimento della bocca e forniscono attacco ai mm della lingua e della faringe

Mandibola, veduta mediale del ramo di destra

Osso ioide, veduta anteriore

(b) Origini e inserzioni

MM. LATERALI del collo

FIGURA 10-11

Muscoli anteriori del collo, Parte II. (a) Veduta anterolaterale di una dissezione del collo, che mostra i muscoli del collo e le strutture adiacenti. (b) Origini e inserzioni sulla clavicola. Vedi anche le Figg. 6-17 e 7-3.

Sternocleidomastoideo

ORIGINE

capo sternale parte alta - faccia anteriore manubrio dello sterno.
capo clavicolare quarto mediale faccia sup clavicola.

INSERZIONE

Processo mastoideo e terzo laterale linea nucale superiore

AZIONE

Estende, flette, inclina lateralmente e ruota dal lato opposto la colonna cervicale e la testa; se prende come punto fisso la testa eleva il torace (muscolo inspiratorio)

INNERVAZIONE

nervo accessorio e rami dei nervi cervicali C2 e C3

MM PREVERTEBRALI E LATERALI

(c) Muscoli della superficie anteriore delle vertebre cervicali e toraciche superiori

MUSCOLI DEL DORSO

Piano profondo:

m. spino-dorsali sub-occipitali

estesi dalle doccia paravertebrali (tra i processi spinosi), le lamine vertebrali, i processi trasversi e le coste.

Piano medio:

m. spino-costali

dalla colonna vertebrale alle coste

Dentato posteriore superiore
Dentato posteriore inferiore

Piano superficiale:

m. spino-appendicolari

dalla colonna vertebrale
alla radice dell'arto sup.

superficialmente

Trapezio
Grande dorsale

profondamente

Romboide
Elevatore della scapola

PIANO PROFONDO

mm. profondi

m. lunghissimo
collo

m. spinale collo

mm. scaleno
ant, medio, post

m. semispinale
collo

m. semispinale
torace

m. multifido

mm. che controllano la posizione
della colonna vertebrale

della testa
del collo
delle coste

mm. superficiali

mm. intervertebrali

veduta posteriore

PIANO MEDIO

Dentato posteriore Inf.

Dentato posteriore Sup.

ORIGINE Legamento nucale (tratto inferiore) e dai processi spinosi C7, T1-T3, legamento sovraspinoso

INSERZIONE Con 4 digitazioni al margine superiore e alla faccia esterna della 2a, 3a, 4a, 5a costa

AZIONE Eleva le coste (muscolo inspiratorio)

INNERVAZIONE Rami dei nervi intercostali (T1-T4) e un ramo del plesso brachiale (C5)

ORIGINE

Foglietto posteriore della fascia lombodorsale (o toracolombare) a livello dei processi spinosi di T11-T12 e L1-L3

INSERZIONE

Con 4 digitazioni al margine inferiore e alla faccia esterna delle ultime 4 coste

AZIONE

abbassa le coste (muscolo espiratorio); estende e inclina lateralmente il tronco (tratto dorsale inferiore)

INNERVAZIONE

Ramo del nervo toracodorsale (C6-C8) e rami dei nervi intercostali (T9-T12)

PIANO SUPERFICIALE

Grande Romboide

ORIGINE Dai processi spinosi della 1a-4a vertebra toracica

INSERZIONE Margine vertebrale della scapola al di sotto della spina

AZIONE Fa aderire strettamente la scapola al torace, la eleva, la ruota internamente e la adduce; agisce anche sul sollevamento e sulla retroposizione della scapola

INNERVAZIONE Nervo dorsale della scapola (C4-C5)

Piccolo Romboide

ORIGINE Dai processi spinosi della 6a e 7a vertebra cervicale

INSERZIONE Margine mediale della scapola

AZIONE Fa aderire strettamente la scapola al torace, la eleva, la ruota internamente e la adduce

INNERVAZIONE Nervo dorsale della scapola (C5)

Elevatore della scapola

ORIGINE Dai processi trasversi di C1-C4

INSERZIONE Angolo mediale e parte alta del margine vertebrale della scapola

AZIONE
Elleva, intra-ruota
e adduce la
scapola

INNERVAZIONE
Rami del plesso
cervicale e del plesso
brachiale (C3-C5)

Trapezio

ORIGINE Parte discendente: linea nucale superiore; protuberanza occipitale esterna; legamento nucale; Parte trasversa: dal processo spinoso della 7a vertebra cervicale al processo spinoso della 3a vertebra toracica Parte ascendente: dal processo spinoso della 2-3a vertebra toracica al processo spinoso della 12a vertebra toracica

INSERZIONE terzo laterale della clavicola, margine mediale acromion, 3/4 laterali labbro superiore della spina della scapola

AZIONE interviene nella inspirazione forzata; eleva, adduce e ruota esternamente la scapola; estende, ruota, inclina lateralmente la testa e la colonna cervicale

INNERVAZIONE nervo accessorio (11° nervo encefalico) e rami del plesso cervicale (C2-C4)

Grande dorsale

ORIGINE Parte vertebrale: dalla fascia lombo-dorsale e dai processi spinosi delle ultime 6 vertebre toraciche
Parte costale: dalla 10a alla 12a costa
Parte scapolare: dall'angolo inferiore del margine laterale della scapola.

INSERZIONE

Cresta della piccola tuberosità omerale (labbro mediale) chiamato anche solco bicipitale;

AZIONE Adduce, estende e ruota internamente l'omero. Interviene nella inspirazione forzata, estende il tronco (tratto lombare e dorsale inferiore) e lo inclina lateralmente (contrazione unilaterale); interviene nella retroposizione della spalla

INNERVAZIONE

Nervo toracodorsale del plesso brachiale (C6-C8)

Muscoli della respirazione

	espirazione	inspirazione
normale	Contrazione di: <ul style="list-style-type: none">- Intercostali esterni- Diaframma	Rilassamento-estensione di: <ul style="list-style-type: none">- Intercostali esterni- diaframma
forzata	Contrazione di: <ul style="list-style-type: none">- Dentato post. Sup.- Elevatori delle coste (o sopracostale)- Elevatore della scapola- Gran dentato- Gran dorsale- Gran pettorale- Ileocostale del collo- Piccolo pettorale- Scaleno anteriore, medio e superiore- Sopra e Sottoioideo- Sternocleidomastoideo (capo sternale e clavicolare)- Succlavio	Contrazione di: <ul style="list-style-type: none">- Dentato post. Inf.- Obliquo esterno- Obliquo interno- Quadrato dei lombi- Retto dell'addome- Trasverso dell'addome - Triangolare dello sterno

DIAFRAMMA

FIGURA 10-14

Il diaframma. Separa la cavità toracica dalla cavità addominale. (a) Veduta inferiore. (b) Veduta superiore. (c) Veduta superiore (da cadavere) del diaframma, dopo rimozione degli organi del torace.

Veduta inferiore

Veduta superiore

Centro frenico

Orifizio vena cava infv

Orifizio aorta

Orifizio esofago

DIAFRAMMA, veduta posteriore

INSERZIONI

ultime sei coste con
lingue muscolari
intersecate alle
inserzioni del m.
trasverso
dell'addome;

inserzioni sul rachide
vengono chiamate

pilastrì:

tre per ogni lato
(mediale, intermedio e
laterale), formano
delle arcate
(lombocostali)
attraverso le quali
passano il m.
quadrato dei lombi (a.
laterale) ed il m. ileo-
psoas (a. mediale)

MUSCOLI DEL TORACE

MM. Intrinseci del torace

Si estendono nell'ambito dello scheletro del torace

mm. Intercostali esterni
interni
mm. Elevatori delle coste
mm. Sottocostali
m. Trasverso del torace

MM. Toraco-Appendicolari

Dallo scheletro del torace si portano
allo scheletro dell'arto superiore

m. Grande pettorale
m. Piccolo pettorale
m. Succlavio
m. Dentato anteriore

GRANDE PETTORALE

ORIGINE La parte clavicolare origina dai 2/3 mediali del margine anteriore della clavicola
 La parte sternocostale origina dalla faccia anteriore dello sterno e dalle prime 6 cartilagini costali
 La parte addominale dal foglietto anteriore della guaina del muscolo retto dell'addome

INSERZIONE Con un unico tendine sul labbro laterale del solco bicipitale dell'omero (cresta della grande tuberosità anteriore dell'omero)

AZIONE Adduce e ruota internamente il braccio. prendendo punto fisso all'omero, solleva il tronco

INNERVAZIONE Nervi toracici anteriori del plesso brachiale (C5-C8 e T1)

PICCOLO PETTORALE

ORIGINE Con 3 digitazioni tendinee dalla faccia esterna e dal margine superiore della 3°, 4° e 5° costa (vicino alla cartilagine costale)

INSERZIONE Apice e margine mediale del processo coracoideo della scapola

AZIONE Abbassa la spalla, la ruota internamente e la abduce; eleva le costole (muscolo inspiratorio)

INNERVAZIONE Nervi toracici anteriori del plesso brachiale (C6-C7).

DENTATO ANTERIORE

ORIGINE Faccia esterna delle prime 10 coste

INSERZIONE Dall'angolo superiore fino all'angolo inferiore lungo tutto il margine vertebrale della scapola.

AZIONE Eleva le costole (muscolo inspiratorio); abduce e ruota esternamente la scapola; fa aderire la scapola al torace. Abbassa e antepone la spalla.

INNERVAZIONE NERVO TORACICO LUNGO del plesso brachiale (C5-C7)

SUCLAVIO

Avvicina la clavicola alla prima costola.

Agisce anche nella inspirazione forzata sollevando la gabbia toracica.

INTERCOSTALI INTERNI ED ESTERNI

11 per lato, si distinguono in interni, medi ed esterni.

Interni dall'angolo costale allo sterno,
Medi dalla linea ascellare allo sterno,
Esterni dai tubercoli delle coste alle cartilagini costali;

originano al margine inferiore di ogni costa e si inseriscono al margine superiore della costa sottostante

Azione: elevano ed abbassano le coste
Innervazione: nervi intercostali

ELEVATORI DELLE COSTE

12 per lato, di forma triangolare

Origine: dai processi trasversi delle vertebre corrispondenti (7° cervicale-11° toracica)

Inserzione: margine superiore della costa sottostante la vertebra d'origine a parte gli ultimi 4 che si inseriscono anche nella costa successiva

Azione: muscoli inspiratori, elevatori delle coste
Innervazione: nervo cervicale

MUSCOLI DELL'ADDOME

Parete antero-laterale dell'addome

•MM. Anteriori →

m. Retto
m. Piramidale

•MM. Laterali →

m. Obliquo esterno
superficiale
m. Obliquo interno
medio
m. Trasverso
profondo
m. Cremastere (maschio)

Parete posteriore dell'addome →

m. Quadrato dei lombi
m. Ileo-psoas
• m. grande psoas
• m. iliaco

RETTO DELL'ADDOME

PARETE ANTERO-LATERALE

ORIGINE

Con 3 fasci carnosì; quello laterale e intermedio origina dal margine inferiore della 5° e 6° cartilagine costale, quello mediale dalla faccia esterna della 7a cartilagine costale e dal processo xifoideo dello sterno

INSERZIONE

Con un corto e robusto tendine al margine superiore del pube, tra il tubercolo e la sinfisi pubica.

AZIONE

Abbassa le coste (muscolo espiratorio); flette il bacino sul torace o viceversa: aumenta la pressione addominale

INNERVAZIONE

Nervi intercostali (T5 -T12), nervo ileoipogstrico del del plesso lombare (L1)

OBLIQUO INTERNO

PARETE ANTERO-LATERALE

ORIGINE

Legamento inguinale, spina iliaca anterosuperiore, linea intermedia della cresta iliaca, faccia posteriore fascia lombodorsale (o toracolombare)

INSERZIONE

Margine inferiore della cartilagine costale delle ultime tre coste (10a-12a); aponeurosi nella parte alta della linea alba; continua nella parte caudale con il muscolo cremastere

AZIONE

Interviene nella espirazione forzata; flette e inclina lateralmente il torace e lo ruota dal proprio lato; aumenta la pressione addominale

INNERVAZIONE

Nervi intercostali (T10-T12), nervi ileopogastrico e ileoinguinale del plesso lombare (L1)

OBLIQUO ESTERNO

PARETE ANTERO-LATERALE

ORIGINE

Trae origine con 8 digitazioni dalla superficie esterna e dal margine inferiore delle ultime 8 coste (5a-12a)

INSERZIONE

Labbro esterno della cresta iliaca, pube, sinfisi pubica, processo xifoideo, linea alba

AZIONE

Abbassa le coste (muscolo espiratorio);
flette e inclina lateralmente il torace e lo
ruota dal lato opposto; aumenta la
pressione intraddominale

INNERVAZIONE

Nervi intercostali (T5-T12), nervi ileoipogastrico e ileoinguinale del plesso lombare (L1)

FIGURA 10-13

I muscoli obliquo e retto. I muscoli obliqui esercitano compressione sulle strutture sottostanti; il muscolo retto flette la colonna vertebrale. (a) Veduta anteriore del tronco: osservare i muscoli superficiali e profondi, nonché il piano della sezione mostrata in (b). (b) Sezione orizzontale del tronco condotta a livello di L₃. (c) Anatomia di superficie della parete addominale. (d) Dissezione (da cadavere) della muscolatura superficiale dell'addome. Vedi anche Figg. 6-19, 6-26, e 7-11.

TRASVERSO DELL'ADDOME

PARETE ANTERO-LATERALE

INNERVAZIONE

Nervi intercostali (T7-T12), nervi ileoipogastrico e ileoinguinale del plesso lombare (L1)

ORIGINE

Con 6 digitazioni dalla faccia interna delle ultime 6 cartilagini costali (7a-12a); dal foglietto profondo della fascia toracolombare; dal ramo interno della cresta iliaca; dalla spina iliaca anterosuperiore; dal legamento inguinale (metà laterale)

INSERZIONE

Con un'aponeurosi nella parte alta della linea alba a cui si uniscono le aponeurosi del trasverso e dell'obliquo interno; sui tendini congiunti (ant.) e su processi spinosi di L1-L5

AZIONE

Porta medialmente le coste (muscolo espiratorio); aumenta la pressione addominale

LINEA ALBA

PARETE ANTERO-LATERALE

QUADRATO DEI LOMBI

PARETE POSTERIORE

ORIGINE strato anteriore: dall'apice dei processi costiformi di L2-L5

Strato inferiore: dal labbro interno della cresta iliaca e dal margine superiore del legamento ileolombare

INSERZIONE Strato anteriore: margine inferiore della 12° costa

Strato inferiore: margine inferiore della 12° costa e apice dei processi costiformi di L1,L2,L3,L4

AZIONE Contraendosi
abbassa la 12° costa
(muscolo espiratorio);
inclina lateralmente la
colonna vertebrale e le
pelvi

INNERVAZIONE n. intercostale (T12) e rami interni dei nervi lombari (L1-L3)

ILEO PSOAS PARETE POSTERIORE

ORIGINE

Corpi e dischi intervertebrali di T12-L4, processi costiformi di L1-L4 e labbro interno della cresta iliaca; spina iliaca anteriore, 2/3 superiori della fossa iliaca, legamento ileolombare, ala del sacro

INSERZIONE

Piccolo trocantere del femore

AZIONE

Flette e ruota esternamente la coscia; flette e inclina lateralmente il tronco

INNERVAZIONE Nervo femorale e rami del plesso lombare (L1-L4)

GRANDE PSOAS

PARETE POSTERIORE

ORIGINE

La parte superficiale: origina dalle superfici laterali dei corpi della 12a vertebra toracica e della 1a-4a vertebra lombare e dai dischi intervertebrali interposti.

La parte profonda origina dai processi costiformi della 1a e 5a vertebra lombare

INSERZIONE

Superficie mediale del piccolo trocantere del femore

AZIONE

Flette la coscia sul bacino, la adduce e la ruota esternamente, inclina lateralmente il tronco

INNERVAZIONE

Rami specifici del plesso lombare e nervo femorale (L1-L3)

ILIACO

PARETE POSTERIORE

ORIGINE

Origina dai 2/3 superiori della fossa iliaca

INSERZIONE

Parte inferiore del piccolo trocantere del femore

AZIONE

Flette la coscia e la ruota esternamente, partecipa alla flessione del tronco

INNERVAZIONE nervo femorale (L2,L3)

PAVIMENTO PELVICO

Piano superficiale:
MM. Perineali superficiali

Anteriori: m. ischio-cavernoso
m. bulbo-cavernoso
m. trasverso superficiale
Posteriore: m. sfintere esterno

Piano medio:
Diaframma (trigono) urogenitale
Perineo anteriore

m. trasverso profondo
m. Sfintere dell'uretra

Piano profondo:
Diaframma pelvico

m. Elevatore dell'ano
m. coccigeo

Piano Superficiale:

anteriori

posteriori

(a) Femmina

FIGURA 10-15

I muscoli del pavimento pelvico. Formano il triangolo urogenitale e il triangolo anale, supportano gli organi pelvici, flettono sacro e coccige, e controllano il passaggio di urina e feci attraverso uretra e ano. (a) Veduta inferiore (perineo femminile). (b) Veduta inferiore (maschile). (c) Origini e inserzioni muscolari sulle ossa del bacino. Vedi anche Figg. da 7-10 a 7-12.

Piano medio

Piano profondo Diaframma pelvico

(c) Veduta inferiore della pelvi, origini e inserzioni muscolari

(b) Maschio

Non ci sono differenze tra la muscolatura maschile e femminile

ARTO SUPERIORE

Spalla: →

m. deltoide
m. sopraspinato
m. sottospinato
m. piccolo rotondo
m. grande rotondo
m. sottoscapolare

Braccio: →

Anteriori m. bicipite
m. coracobrachiale
m. brachiale
Posteriori m. tricipite
m. anconeo

Avambraccio: →

Anteriori
detti epitrocleari disposti in quattro piani
Laterali m. brachioradiale
m. estensore radiale lungo
m. estensore radiale corto
Posteriori
Disposti in due piani

m. piccolo rotondo(6), origine dalla faccia posteriore e dal margine laterale della scapola

inserzione sulla faccetta inferiore della grande tuberosità dell'omero

m. Grande rotondo(5) origine dalla faccia posteriore e dal margine laterale della scapola

inserzione sulla faccia anteriore dell'omero subito sotto al collo.

m. sottospinato(8) origine sui 2/3 mediali della fossa omonima
inserzione sulla faccia media della grossa tuberosità dell'omero

m. sopraspinato(7) origine dalla fossa sopraspinata, al di sopra della spina della scapola

inserzione alla faccetta superiore del tubercolo maggiore dell'omero, passando inferiormente all'acromion

ARTO SUPERIORE: DELTOIDE

ORIGINE

Parte clavicolare: terzo laterale del margine anteriore della clavicola;

Parte acromiale: dall'apice e dal margine laterale dell'acromion

Parte spinale: dal labbro inferiore della spina della scapola

INSERZIONE

Metà della superficie lat dell'omero (tuberosità deltoidea)

AZIONE Abduce il braccio fino a 90°, le fibre anteriori flettono e ruotano medialmente, le fibre posteriori estendono e ruotano lateralmente

INNERVAZIONE Nervo ascellare (C4-C6) (corde posteriori); per la parte clavicolare anche rami pettorali (C4-C4)

ARTO SUPERIORE: BICIPIDE BRACHIALE

ORIGINE

Il capo lungo origina dalla tuberosità sovraglenoidea scapolare e con un tendine dal labbro glenoideo

Il capo breve origina dall'apice del processo coracoideo della scapola (coracoide)

INSERZIONE

Il capo lungo si inserisce sul capo breve il quale si inserisce con un tendine molto robusto alla tuberosità bicipitale del radio, un secondo tendine, superficiale, irradia nella fascia dell'avambraccio dal lato ulnare.

AZIONE Flette e supina l'avambraccio, flette il braccio, partecipa all'estensione orizzontale, all'adduzione, abduzione e rotazione interna del braccio. Antiverge la spalla.

INNERVAZIONE n. muscolo cutaneo (C5, C6)

ARTO SUPERIORE: TRICIPITE

ORIGINE

Capo lungo: dalla tuberosità sottoglenoidea della scapola ed al labbro glenoideo
Capo laterale: dalla faccia posteriore dell'omero sopra e lateralmente al solco del nervo radiale
Capo mediale: dalla faccia posteriore dell'omero sotto al solco del nervo radiale

INSERZIONE

Con un tendine terminale comune sull'olecrano dell'ulna e sulla parete posteriore della capsula articolare del gomito

AZIONE

Estende l'avambraccio, adduce ed estende il braccio

INNERVAZIONE

NERVO RADIALE (C6-C8)

ARTO SUPERIORE: MUSCOLI AVAMBRACCIO

BRACHIALE

ORIGINE Metà inferiore (distale) della faccia anteromediale e anterolaterale dell'omero

INSERZIONE Sulla tuberosità dell'ulna

AZIONE Flette l'avambraccio

INNERVAZIONE NERVO MUSCOLOCUTANEO (C5-C6); una piccola porzione laterale del muscolo è innervata dal nervo radiale

PRONATORE ROTONDO (anteriore)

Il muscolo pronatore rotondo è il più laterale dei muscoli anteriori

dell'avambraccio.

ORIGINE capo omerale: dall'epicondilo mediale dell'omero e setto intermuscolare mediale. Capo ulnare: dal processo coronoideo dell'ulna.

INSERZIONE faccia postero-mediale del calcagno

AZIONE Prona e flette l'avambraccio

INNERVAZIONE Nervo mediale (C6-C7)

BRACHIORADIALE (laterale)

Il muscolo brachioradiale è un muscolo superficiale che occupa la regione laterale dell'avambraccio

ORIGINE cresta sopracondiloidea laterale dell'omero; setto intermuscolare laterale. **INSERZIONE**

faccia radiale del processo stiloideo del radio **AZIONE** Flette il gomito e porta l'avambraccio in una posizione intermedia tra pronazione e supinazione

INNERVAZIONE nervo radiale (C5-C6)

ARTO INFERIORE

Anca: →

Interni: m. ileo-psoas
m. piriforme
m. otturatore interno
Esterni m. grande, medio e piccolo gluteo
m. gemelli superiore ed inferiore
m. quadrato del femore

Coscia: →

Antero.-laterali m. sartorio
m. quadricipite femorale
m. tensore della fascia lata
Mediali m. pettineo
m. adduttore lungo, grande, corto e minimo
m. adduttore grande
m. gracile
m. otturatore esterno
Posteriori m. bicipite femorale
m. semitendinoso
m. semimembranoso

ARTO INFERIORE

Gamba : →

Anteriori	m. tibiale anteriore m. estensore lungo dell'alluce m. estensore lungo delle dita m. peroneo terzo
Laterali	m. peroneo lungo m. peroneo corto
Posteriori	m. tricipite della sura (superficiale) m. plantare (superficiale) m. popliteo (profondo) m. flessore lungo delle dita (profondo) m. flessore lungo dell'alluce (profondo) m. tibiale posteriore (profondo)

ARTO INFERIORE:

PICCOLO GLUTEO

ORIGINE Davanti alla linea glutea ant. e dall'estremità ant. del labbro esterno della cresta iliaca

INSERZIONE

Superficie ant. del grande trocantere del femore

AZIONE Abduce e ruota internamente la coscia (femore) **INNERVAZIONE** n gluteo sup. del plesso sacrale (L4-S1)

MEDIO GLUTEO

ORIGINE linee glutee ant. e post. dell'anca, esterno della cresta iliaca, spina iliaca ant. Sup.

INSERZIONE Faccia esterna del grande trocantere

AZIONE Abduce la coscia. Le fibre ant. flettono e ruotano internamente la coscia; le fibre post. estendono ed extraruotano la coscia.

INNERVAZIONE Nervo gluteo superiore (L4,L5,S1)

GRANDE GLUTEO

ORIGINE Parte superficiale: dal labbro esterno della cresta iliaca, dalla spina iliaca post. sup., dalla fascia toracolombare (o lombodorsale), dalla faccia post. dell'osso sacro e dal coccige. Parte profonda: dall'ala dell'ileo,

dietro la linea glutea post., dal legamento sacrotuberoso (o sacroiliaco) e dalla fascia del muscolo medio gluteo. **INSERZIONE**

Tuberosità glutea (parte prossimale) e tratto ileo-tibiale fascia lata (parte distale). **AZIONE**

Estende, adduce e ruota esternamente la coscia. Con i suoi fasci superiori abduce **INNERVAZIONE** n. gluteo inf. del plesso sacrale (L5, S2)

QUADRICIPITE FEMORALE

VASTO INTERMEDIO

ORIGINE

Labbro laterale della linea aspra del femore e dai tre quarti superiori delle facce anteriori e laterali del femore **INSERZIONE**

Patella (alcune fibre formano il legamento patellare e si inseriscono alla tuberosità della tibia) **AZIONE**

Estende la gamba **INNERVAZIONE**
NERVO FEMORALE (L2,L4)

VASTO LATERALE

ORIGINE

Margine anteriore del grande trocantere e dal labbro laterale della linea aspra del femore **INSERZIONE**

Patella (alcune fibre formano il legamento patellare e si inseriscono alla tuberosità della tibia) **AZIONE**

Estende la gamba **INNERVAZIONE**
Nervo femorale (L2,L4)

RETTO FEMORALE

ORIGINE Capo diretto: spina iliaca anteriore inferiore Capo riflesso: solco sopraacetabolare (margine superiore dell'acetabolo) **INSERZIONE**

Patella (alcune fibre formano il legamento patellare e si inseriscono alla tuberosità della tibia) **AZIONE**
Estende la gamba e partecipa alla flessione della coscia **INNERVAZIONE**
Nervo femorale (L2,L4)

VASTO MEDIALE

ORIGINE

Labbro mediale della linea aspra e linea rugosa **INSERZIONE** Patella (alcune fibre formano il legamento patellare e si inseriscono alla tuberosità della tibia) **AZIONE**

Estende la gamba, stabilizza la patella **INNERVAZIONE**
Nervo femorale (L2,L4)

ARTO INFERIORE: TENSORE DELLA FASCIA LATA

ORIGINE Estremità ant. della cresta iliaca, spina iliaca ant. sup., faccia superficiale del muscolo medio gluteo, fascia glutea profonda

INSERZIONE Al condilo lat della tibia con un tendine che nel tragitto si fonde con la fascia femorale formando il tratto ileotibiale

AZIONE

Tende la fascia lata; flette, abduce e ruota internamente la coscia; estende (debolmente) la gamba sulla coscia

INNERVAZIONE

Nervo gluteo superiore del plesso sacrale (L4, L5, S1)

BICIPIDE FEMORALE

ORIGINE

Capo lungo: parte sup della tuberosità ischiatica. Capo breve: labbro lat della linea aspra del femore e dal setto intermuscolare lat

INSERZIONE

Con un tendine comune sul processo stiloideo della testa della fibula, sul condilo lat della tibia e sulle parti contigue della faccia della gamba

AZIONE

Flette e ruota esternamente la gamba, estende la coscia

INNERVAZIONE

n. tibiale (capo lungo) e n. peroniero comune (capo breve) (L4-S1)

ARTO INFERIORE:

SEMIMEMBRANOSO

ORIGINE Tuberosità ischiatica

INSERZIONE Con un fascio sulla parte post del condilo mediale tibiale (tendine riflesso e discendente),

con un altro fascio il legamento popliteo obliquo, con un altro termina sulla parte ant del condilo mediale della tibia (tendine ricorrente)

AZIONE Estende e adduce la coscia; flette e ruota internamente (a ginocchio flesso) la gamba

INNERVAZIONE n. tibiale (L4-S1)

SEMITENDINOSO

ORIGINE

Tuberosità ischiatica

INSERZIONE

Parte superiore della faccia mediale della tibia

AZIONE

Estende e adduce la coscia; flette e ruota internamente (a ginocchio flesso) la gamba

INNERVAZIONE
NERVO TIBIALE
(L4-S1)

ARTO INFERIORE:

SARTORIO

ORIGINE

Spina iliaca anteriore superiore

INSERZIONE

Estremità superiore della faccia mediale della tibia

AZIONE

Flette la gamba e la coscia; abduce e ruota

esternamente la coscia; ruota

internamente la gamba (a ginocchio flesso)

INNERVAZIONE

NERVO

FEMORALE (L1-L3)

GRANDE ADDUTTORE

ORIGINE

Faccia anteriore della branca ischiopubica e dal ramo dell'ischio fino alla tuberosità ischiatica

INSERZIONE

Labbro mediale della linea aspra fino all'altezza del tubercolo del grande adduttore dell'epicondilo mediale

AZIONE

Adduce e ruota all'interno la coscia

INNERVAZIONE

Nervo otturatore e nervo tibiale dell'ischiatico L2-S1

ARTO INFERIORE:

ADDUTTORE LUNGO

ORIGINE

Faccia anteriore del ramo superiore del pube (tra tubercolo e sinfisi)

INSERZIONE

Terzo medio della linea aspra del femore

AZIONE

Adduce e ruota esternamente la coscia. Partecipa alla flessione della coscia sul bacino

INNERVAZIONE

Nervo otturatorio del plesso lombare (L2-L4)

GASTROCNEMIO O GEMELLI

ORIGINE

Gemello laterale: epicondilo laterale del femore, piano popliteo e porzione posteriore della capsula articolare del ginocchio

Gemello mediale: epicondilo mediale del femore, piano popliteo e porzione corrispondente della capsula articolare del ginocchio

INSERZIONE

Nel tendine calcaneare (o d'Achille) sul terzo medio della faccia posteriore del calcagno

AZIONE

Estende il piede (lo flette plantarmente) e lo ruota internamente, contribuisce alla flessione della gamba

INNERVAZIONE

NERVO TIBIALE (L4-S1)

ARTO INFERIORE:

SOLEO

ORIGINE

Testa, faccia dorsale e margine laterale della fibula; linea obliqua e arcata del muscolo soleo sulla tibia

INSERZIONE

Nel tendine calcaneare (o d'Achille) sul terzo medio della faccia posteriore del calcagno

AZIONE

Estende il piede (lo flette plantarmente) e contribuisce alla flessione della gamba

INNERVAZIONE

NERVO TIBIALE (L4-S1)

TIBIALE ANTERIORE

ORIGINE

Condilo laterale (tubercolo del Gerdy) e metà superiore della faccia laterale della tibia, porzione superomediale della membrana interossea, fascia crurale, setto intermuscolare

INSERZIONE

Tubercolo del primo cuneiforme e base del primo metatarsale

AZIONE
Flette dorsalmente, adduce (supina) e ruota medialmente il piede

INNERVAZIONE

Nervo peroneo profondo (L4-L5)

Slides scarto

(a) Occhio destro, superficie laterale

(b) Occhio destro, superficie mediale

(c) Occhio destro, veduta anteriore

FIGURA 10-5

Muscoli estrinseci dell'occhio. (a) Muscoli della superficie laterale (occhio destro). (b) Muscoli della superficie mediale (occhio destro). (c) Veduta anteriore dell'occhio destro: notare l'orientamento dei muscoli oculomotori e la direzione dei movimenti oculari determinata dalla contrazione dei singoli muscoli. Vedi anche la Fig. 6-3.

5.37 I muscoli profondi del dorso. A sinistra sono stati asportati il sacrospinale e i muscoli che lo continuano verso l'alto (ad eccezione del lunghissimo del collo che è stato spostato lateralmente) e il semispinale della testa.

FIGURA 9-5

Struttura del sarcomero. Organizzazione della più piccola unità contrattile di una cellula muscolare scheletrica. (a) Organizzazione dei filamenti spessi e sottili all'interno del sarcomero. (b) Sezione trasversale delle diverse parti del sarcomero. (c) Sarcomero in una miofibrilla del muscolo *gastrocnemio* del polpaccio (MET $\times$ 64.000) e schema che illustra le diverse componenti in sezione longitudinale.