Malattie Neurologiche

SINTOMI ED ASPETTI FISIOPATOLOGICI

Clinical method in neurology

1. Is there a neurological disorder?
2. Where is the lesion located
3. What disease is it?

sistema neuro-muscolare

SISTEMA MUSCOLARE:

- **tessuto muscolare liscio**: fibre muscolari allungate con miofibrille che consentono la contrazione della cellula; movimenti involontari;
- **tessuto muscolare striato**: fibre muscolari striate con miofibrille che originano striature chiare e scure; movimenti volontari;
- **tessuto muscolare cardiaco**: particolare tessuto striato le cui contrazioni non dipendono dalla volontà

Liscio

striato

cardiaco

CERVELLO

Evoluzione dell'area associativa

» Come si vede nella figura, la porzione rappresentata dalle **aree associative aumenta notevolmente**, rispetto all'estensione degli altri due tipi di aree, man mano si sale dai mammiferi evolutivamente più semplici, come i felini e i ratti, a quelli più complessi, come le scimmie e l'uomo.

Background

- The stronger neurologists' grasp of **anatomy, physiology, biochemistry**
- The greater the ability in the **clinical context**
 - Without this solid background a neurological diagnosis becomes a **gamble**

Questions and diagnosis

- In what functional context must be observed disorders and/or signs be framed?
 - Syndromic diagnosis
- What is the site of the lesion responsible for the disorder?
 - Anatomical or topographical diagnosis
- What is the cause of the disease?
 - Pathological diagnosis
- What is the true aetiology?
 - Not completely known

Contribute to the diagnosis: well begun is half done

- Medical history and neurological examination will allow the questions to be answered in **75% of cases**
- Instrumental examination **can always be requested** subsequently
- **Once** the diagnostic hypothesis has been formulated, **and only then**, instrumental and/or laboratory examination considered useful can be performed

Diagnosis solving questions

- Identical symptoms may be linked to **different disease**
 - The **same disease** can manifest itself in different ways
 - It is easier to encounter rare manifestations of common disease than typical manifestations of rare disease (**Bayes's theorem**)
- There is non reason to complicate what is simple: the law of parsimony or simplicity (**Occam's razor**)

- [William of Ockham](#) (circa 1287–1347) was an English Franciscan friar and theologian, an influential medieval philosopher and a [nominalist](#).
 - [Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate](#) [Plurality must never be posited without necessity]
- Bayes' theorem was named after the Reverend [Thomas Bayes](#) (1701–1761)

Neurological examination

- Mental condition and symbolic function
- Motor system and movement coordination
- Sensory system
- Autonomic function
- Fundus oculi examination

SINTOMI NEUROLOGICI

- **DOLORE**
- **VERTIGINE**
- **ATASSIA** (disturbi dell'equilibrio)
- **FATICA**
- **PERDITA DI FORZA** (paresi)
- **PERDITA DI MOVIMENTO** (paralisi)
- **MOVIMENTI ECCESSIVI** (tremore altri disturbi del movimento)
- **ALTERAZIONE DELLA SENSIBILITA'**
- **ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA**
 - Sincope
 - Confusione
 - Coma
 - Morte cerebrale

Le malattie di cui la NEUROLOGIA si occupa più frequentemente sono:

- ICTUS CEREBRALE -
- EPILESSIA -
- CEFALEA -
- MORBO DI PARKINSON E MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI -
- MALATTIE INFIAMMATORIE / INFETTIVE DEL SISTEMA NERVOSO -
- NEUROPATIE PERIFERICHE E MALATTIE MUSCOLARI
- SCLEROSI MULTIPLA -
- DEMENZA
- TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO -

- TRAUMI CRANICI E SPINALI

In sanità, nell'ultimo decennio, abbiamo assistito ad una tumultuosa evoluzione, dominata dal grande progresso tecnologico, che ha profondamente modificato la Mission

Ospedaliera:

”da luogo di riferimento per qualsiasi problema di una certa rilevanza di natura sanitaria, e spesso socio-sanitaria, a organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e capace) di fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati da acuzie e gravità”.

Accordo Stato – Regioni sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (Decreto sui LEA) del Novembre 2001.

ICTUS - STROKE

1. Ischemico
2. Emorragico

ictus cerebrale

- Patogenesi. Circa l'80-85% è di natura ischemica, circa il 15-20% è di origine emorragica (emorragia cerebrale nella maggior parte, meno frequentemente emorragia subaracnoidea).
- Prognosi: le forme ischemiche sono in genere a prognosi migliore rispetto alle forme emorragiche ed hanno una letalità a 30 giorni oscillante nei vari studi tra il 10% e il 15%.
- La mortalità a 30 giorni dopo ricovero per ictus: indicatore valido e riproducibile dell'appropriatezza ed efficacia del processo diagnostico-terapeutico che inizia con il ricovero ospedaliero.
- L'attribuzione dell'esito alla struttura di primo accesso (struttura di ricovero o dalla struttura sede del PS) non implica la valutazione della qualità dell'assistenza fornita da quella struttura ma dell'appropriatezza ed efficacia del processo assistenziale che inizia con l'arrivo del paziente a quella struttura.

CRITICITA'

- NEI FENOMENI FISICI E CHIMICI, CONDIZIONE PARTICOLARE E CARATTERISTICA IN CUI AL **MINIMO** VARIARE DEI PARAMETRI SI PRODUCONO EFFETTI DI **GRANDE** ENTITA'

URGENZA

- **NECESSITA' DI UN'AZIONE IMMEDIATA**

EMERGENZA

CIRCOSTANZA O EVENTUALITA' IMPREVISTA

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI

Quadro neurologico

evoluzione dei sintomi

Pathophysiological events	Clinical findings
<p><i>Initial hemorrhage</i></p> <p>AXIAL VIEW: Shows a small red hemorrhage in the left lateral ventricle. CORONAL VIEW: Shows the hemorrhage in the lateral ventricle, with labels for 'Lateral ventricle' on both sides.</p>	<p>Hemiparesis</p>
<p><i>Continued bleeding, compression of adjacent tissues, and increased intracranial pressure</i></p> <p>AXIAL VIEW: Hemorrhage is larger. CORONAL VIEW: Hemorrhage is larger, compressing the lateral ventricle and third ventricle. SAGITTAL VIEW: Shows compression of the third ventricle, lateral ventricle, and brainstem. Labels include: Lateral ventricle, Third ventricle, Tentorium cerebelli, Fourth ventricle, Median aperture, Subarachnoid space, Brainstem.</p>	<p>Headache Vomiting Hemiplegia Drowsiness</p>
<p><i>Dissection of blood into the ventricles and extension of blood into the subarachnoid space; uncal herniation</i></p> <p>AXIAL VIEW: Blood has dissected into the lateral ventricle. CORONAL VIEW: Blood is in the lateral ventricle and subarachnoid space. SAGITTAL VIEW: Shows uncal herniation and blood extension via the lateral aperture. Labels include: Lateral ventricle, Subarachnoid space, Tentorium cerebelli, Uncal herniation, Brainstem. Text at bottom: 'Extension of blood via lateral aperture'.</p>	<p>Neck stiffness Coma</p>

EMORRAGIA CEREBRALE NON TRAUMATICA

12-15/100.000 (10-30% stroke)

- **PRIMITIVA**
- **Ipertensione arteriosa - arteriosclerosi (80%)**
- **Amiloidosi (anziani - demenza)**
- **SECONDARIA**
- **Coagulopatia congenita/acquisita**
- **Malformazioni vascolari**

sopratentoriale

La **dislocazione progressiva** del tessuto cerebrale provoca erniazioni **e deterioramento rostro-caudale**. Le ICH sottotentoriali esordiscono con coma nel 30% dei casi.

sottotentoriale

Inondazione ventricolare (IVH)

- presente nel 45% delle ICH è predittore indipendente di peggiore outcome

Piccoli stravasi non hanno effetti.

Grandi stravasi danno aumento pressorio nel IV° ventricolo con insufficienza pontina o bulbare ed effetti negativi su TA, FC e respiro. Possono causare **idrocefalo ostruttivo**.

1. Danno secondario

- Edema peri-lesionale 1) rilascio di sostanze osmoticamente attive da parte del coagulo le metalloproteinasi 2) alterazione del flusso ematico e della BEE.

In verde la progressione dell'edema peri-lesionale dalle prime ore a 7 giorni dopo l'ICH

- Butcher KS et al. **Stroke** 2004; 35:1879-1885

- Qureshi AI **Lancet**

2009; 373:1632-1644

- Castellazzi M et al **Acta**

Neurochir Suppl 2010; 106: 137-140

EMORRAGIA CEREBRALE POST-TRAUMATICA

- Intra-parenchimale
- Sub-aracnoidea
- **Sottodurale** (acuta – cronica)
- **Extradurale**
tipicamente post-traumatiche

L'emorragia intracerebrale (EIC) è il secondo sottotipo più frequente di stroke dopo quelli ischemici

- L'emorragia intracerebrale (EIC) è il secondo sottotipo più frequente di stroke dopo quelli ischemici
 - 📖 incidenza pari a 24.6 per 100.000 persone anno
 - 📖 Rappresentano il 10-20% di tutti gli eventi ictali.
 - 📖 mortalità a 30 giorni: 35-52% (metà dei casi entro 48 ore)
 - 📖 indipendenza a 6 mesi: meno del 20% dei pazienti
- * ictus ischemici: mortalità a 30 giorni = 10-25%

Sintomi : E. sub-aracnoidea da rottura aneurisma

- Esordio brutale
- Cefalea violenta
- Fotofobia, vomito
- Disturbo di coscienza
- Rigidità meningea
- Segni localizzatori

18.00: Crisi epilettica mentre guida l'auto

19.40 in PS: paziente vigile , amnesico , non segni di lato

19.42 TAC cranio → NCH

19.49 Stato di male epilettico: IOT.

AGF: aneurisma dell'a. pericallosa

Sintomi : **malformazioni artero-venose (mav)**

- In assenza di emorragia
 - Epilessia
 - Crisi emicraniche
 - Segni neurologici focali
- In presenza di emorragia (avviene nei $\frac{3}{4}$ dei pazienti)
 - Cefalea
 - Rigidità nucale
 - Segni neurologici focali
 - 10% di mortalità immediata

TABLE 38-2**Glasgow Coma Scale**

BEHAVIOR	RESPONSE	SCORE
Eye opening response	Spontaneously	4
	To speech	3
	To pain	2
	No response	1
Best verbal response	Oriented to time, place, and person	5
	Confused	4
	Inappropriate words	3
	Incomprehensible sounds	2
	No response	1
Best motor response	Obeys commands	6
	Moves to localized pain	5
	Flexion withdrawal from pain	4
	Abnormal flexion (decorticate)	3
	Abnormal extension (decerebrate)	2
	No response	1
Total score:	<i>Best response</i>	15
	<i>Comatose client</i>	8 or less
	<i>Totally unresponsive</i>	3

GESTIONE E TRATTAMENTO

ESORDIO

Emergenza

EVOLUZIONE

**Peggioramento
TAC**

IIIIC > 20
mmH₂O

GCS < 8

**PO₂ < 60 mmhg
CO₂ > 50 mmhg**

Consulenza NCH

Consulenza RNM

NCH

Craniotomia
Emicraniectomia
Derivazione
esterna liquorale

ICU

IOT
Coma
farmacologico

FATAL OUTCOME

- **Lower GCS**
- **Early enlargement of ICH**
- **Older age**
- **OAC therapy**
- **General medical-surgical admission**

- **...much attention has focused recently on the major role that therapeutic nihilism and self**

GLASGOW	COMA	SCALE
Apertura degli occhi	Spontanea	4
	Alla Parola	3
	Al Dolore	2
Risposta verbale	Assente	1
	Adeguata	5
	Confusa	4
Risposta motoria	Senza Senso	3
	Incomprensibile	2
	Assente	1
	Adeguata	6
	Localizza Lo Stimolo	5
	Flessione (Normale)	4
	Flessione (Con Adduzione)	3
	Estensione	2
	Assente	1

SEGNI CLINICI LOCALIZZATORI

EMATOMA CEREBRALE

TAC pre-op

TAC post-op

Paziente vigile, confuso, agitato, muove spontaneamente i 4 arti, localizza il dolore, non risponde a domanda, non esegue ordini impartiti (8.41)

Anisocorico (dx>sx), non reagente (12.27)

Arresto cardiorespiratorio (22.40)

Ematoma sottodurale bilaterale fronto-temporo-parietale, a destra con spessore massimo di 5 mm, a sinistra con spessore massimo di 6 mm, concomita modesta **emorragia sub-aracnoidea** a sede frontale ed occipitale bilateralmente. In sede temporale bilaterale **focolai emorragici**, a destra con maggior asse di 55 mm, a sinistra con maggior asse di 34 mm. Non segni di ipertensione endocranica. Strutture della linea mediana ancora in asse. **Frattura** del temporale destro estesa sino alla rocca.

L'esame, confrontato con il precedente espletato in stessa data, fa rilevare: ulteriore aumento in dimensioni del **focolaio emorragico** in regione temporale sn (7 x 4 cm) e dell'edema perilesionale responsabili di iniziale **shift delle strutture della linea mediana** controlateralmente. Sostanzialmente invariati in dimensioni gli altri focolai emorragici sia in regione sotto che sovratentoriale. Appiattiti i solchi della convessità.

Sg-ERITROCITI * 2,94
Sg-EMOGLOBINA * 9,4
Sg-MCV * 99 fl 83 - 96
Sg-EMATOCRITO * 29,1 %
Sg-MCH 32,0 pg 28,
Sg-MCHC 32,3 g/dL 28,
Sg-RDW * 19,7 0,0 - 17,0
Sg-PIASTRINE * 32
Sg-**LEUCOCITI * 67,3 10E3/mmc**

Disorientamento e confabulazione

Soporoso risvegliabile disartico muove i 4 arti comprende ordini semplici

Afasico ed emiparesi destra

Soporoso non risvegliabile dolore muove gli arti di sx pupille reagenti eupnoico

Iperpiressia > 40 Coma

STROKE UNIT

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI

INDICATORI: N° DI EVENTI

MIGLIORARE LA PROGNOSI

INDICATORI