SOLUBILIZZAZIONE

Simile scioglie il simile: le molecole di sostanze diverse si mescolano intimamente nelle miscele se possiedono forze intermolecolari simili (soluzioni ideali). Anche se le forze intermolecolari non sono simili, si può ottenere una soluzione ma la quantità di specie miscibile è piccola (sostanze poco solubili).

Soluzioni liquide: consistono in un solvente liquido, ed uno o più soluti che possono essere solidi, liquidi o gas.

La solubilizzazione consiste di vari processi così riassumibili:

1. Rottura delle forze intermolecolari del soluto
2. Rottura delle forze intermolecolari del solvente (per essere disponibili nella solvatazione)
3. Solvatazione delle molecole di soluto

La reazione completa può essere quindi **Esotermica (1) o endotermica(2) a seconda dei valori di ΔH dei diversi processi.**

Dipendenza della Solubilità dalla temperatura

La solubilità varia con la temperatura in conseguenza del valore di ΔH di solubilizzazione.

Se $\Delta H_{\text{solubil.}} > 0$, la reazione è endotermica e quindi la solubilità aumenta con la temperatura

Se $\Delta H_{\text{solubil.}} < 0$, la reazione è esotermica e quindi la solubilità diminuisce con la temperatura.

Nel caso dei gas, non essendo presente il processo di rottura delle forze intermolecolari, la reazione di solubilizzazione è un processo sempre esotermico e quindi tutti i gas diminuiscono la solubilità all'aumentare della temperatura.

La solubilità di un gas dipende anche dalla pressione (parziale) del gas sulla soluzione:

$$\text{Legge di Henry: } S(g) = K_H \times P(g)$$

La Costante di Henry (K_H) è la costante di equilibrio della reazione:

Solubilità dei solidi

Definizione: La solubilità (S) è la concentrazione massima che può possedere una specie chimica in soluzione.

La concentrazione massima si ha quando la soluzione è in presenza della stessa specie solida (corpo di fondo). In questo caso la soluzione viene detta "satura".

$$K_{eq} = \frac{[\text{zucchero}]_{(\text{soluz})}}{\text{zucchero}(s)} = [\text{zucchero}]_{(\text{soluz})} \quad \leftarrow S \quad \text{perché attività del solido} = 1$$

Per i Sali

si ha:

La costante di solubilità si chiama "Prodotto di Solubilità"

Equilibrio di solubilità

Equilibrio eterogeneo:

Sale solido

Corpo di fondo

sale che

passa in soluzione

Ioni derivanti dalle

completa dissociazione

del sale nei propri ioni

La solubilità (S), definita come concentrazione massima del sale è uguale a

$[\text{AgCl}]_{(\text{sol})}$ ma questa non esiste come tale e quindi $S = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$

Per l'equilibrio $\text{Mg}(\text{OH})_2(s) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+} + 2 \text{OH}^-$ si avrà quindi che $[\text{Mg}^{2+}] = S$
ma $[\text{OH}^-] = 2S$

$$K_{PS} = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{\text{AgCl}(s)} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = S^2 \quad \text{da cui} \quad S = \sqrt{K_{PS}}$$

Per $\text{Mg}(\text{OH})_2$

$$K_{PS} = \frac{[\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2}{\text{Mg}(\text{OH})_2(s)} = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 4S^3 \quad \text{da cui} \quad S = \sqrt[3]{K_{PS}/4}$$

Effetto dello ione comune

Es.

Se ad una soluzione satura di AgCl, si aggiunge del Cl⁻ cosa succede?

$$K_{PS} = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{\text{AgCl}(s)} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

Poiché il prodotto di solubilità deve sempre valere il valore della KPS si avrà che all'aumentare di [Cl⁻] dovrà diminuire [Ag⁺] e questo si realizza con la precipitazione di AgCl.

In generale l'aggiunta di uno ione comune quindi diminuisce la solubilità del sale

SOLUBILITA' in funzione del pH

La specie Mg(OH)₂ ha una K_{PS} = 1.8 · 10⁻¹¹ la sua solubilità sarà:

$$S = \sqrt[3]{K_{PS}/4} = \sqrt[3]{1.8 \cdot 10^{-11}/4} = \sqrt[3]{4.5 \cdot 10^{-12}} = 1.65 \times 10^{-4}$$

Se mettiamo Mg(OH)₂ in una soluzione tamponata a pH = 6 quanto vale la sua solubilità?

$$K_{PS} = 1.8 \cdot 10^{-11} = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 \qquad S = [\text{Mg}(\text{OH})_2] = [\text{Mg}^{2+}]$$

$$\text{A pH} = 6 \quad [\text{OH}^-] = 10^{-8} \quad \text{per cui} \quad S = 1.8 \cdot 10^{-11}/10^{-16} = 1.8 \cdot 10^5$$

$$\text{A pH} = 5 \quad S = 1.8 \cdot 10^7, \quad \text{etc. etc.}$$

Sostanza che cambia solubilità in funzione del pH !!!!

Tutti i Sali che possiedono ioni a carattere acido o basico subiscono l'influenza del pH imposto dall'esterno.

SOLUBILITA' in funzione del pH

Ogni sale poco solubile, costituito da ioni con carattere acido o basico, può essere portato in soluzione per aggiunta di un una base forte od acido forte e la reazione è quantitativa.

Fanno eccezione i Sali così poco solubili che per essere portati in soluzione necessitano di concentrazioni di H_3O^+ o OH^- irraggiungibili.

Se mettiamo HgS in H_2O quanto vale la sua solubilità?

$$K_{pS} = 4 \cdot 10^{-53} = [Hg^{2+}][S^{2-}]$$

$$S = [Hg^{2+}] = 2 \cdot 10^{-26.5}$$

Perché S sia 10^{-2} $[S^{2-}]$ deve valere $4 \cdot 10^{-51}$ per cui

$$K_a = [S^{2-}][H_3O^+]^2/[H_2S] \text{ da cui } [H_3O^+] = \sqrt{K_a [H_2S]/[S^{2-}]} = \sqrt{10^{-22}/4 \cdot 10^{-51}} = 5 \cdot 10^{19}$$

valore irraggiungibile

Formazione delle stalattiti e stalagmiti di calcare ($CaCO_3$)

Equilibri:

La carenza di CO_2 fa diminuire la solubilità del $CaCO_3$

Equilibrio di Formazione di Complessi (di coordinazione)

$$K_f = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2} \quad \text{Costante di Formazione}$$

$$K_{\text{inst}} = \frac{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]} \quad \text{Costante di Instabilità}$$

La quantità di complesso in soluzione dipende dal valore della K_f . Più grande è la K_f maggiore è la quantità di complesso!

Se si vuole aumentare ancora la concentrazione di $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ si può aggiungere ammoniaca

Solubilità è complessazione

$$K_{\text{ps}} = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{\text{AgCl}(s)} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$K_f = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}$$

I due equilibri contengono la stessa specie Ag^+ e uno è spostato a sinistra e l'altro a destra.

Vince l'uno o l'altro in funzione delle concentrazioni delle specie NH_3 e Cl^- in soluzione.